

ریسپایرتوري سنسیتیال وایرس (RSV) د تنفسي سنسیتیال وایرس یو عام ویرس دی چې په سرو اغیزه کوي. دا د ماشومانو او لویانو لپاره ډیر خطرناک کیدی شي. دا د ماشومانو په روغتون کې د بستر کېدو اصلي سبب دی. له نېکه مرغه، د شدید RSV څخه د ماشومانو د ساتنې لپاره دوه انتخابونه شتون لري، او ډیری ماشومان یوازې یو ته اړتیا لري: د امیندواری پرمهال ورکړل شوی RSV واکسین یا د RSV انټي باډي، چې د نیرسیویماب (Nirsevimab) په نوم یادېږي، ماشوم ته ورکول کېږي. ستاسو نوی زیربډلی ماشوم ممکن د زیږون وروسته په روغتون کې د نیرسیویماب ترلاسه کولو وړ وي. دا د RSV په وړاندې سمدستي محافظت چمتو کوي او لږترلږه پنځه میاشتې دوام کوي.


که تاسو دې معلوماتو ته د لاسرسي یا پوهیدو کې مرستې ته اړتیا لرئ، نو اړیکه ونیسئ

[ahs.vdhimmunizationprogram@vermont.gov](mailto:ahs.vdhimmunizationprogram@vermont.gov)

نیرسیویماب د شدید RSV سره د ماشومانو په روغتون کې د بستر کېدو مخنیوي کې 90% اغیزمن دی.

## RSV حقایق

- د RSV وخت په مني کې پیل کېږي او په ژمي کې لوړېږي.
- دا هغه وخت زیاتېږي کله چې یو اخته کس توخی یا پرنجی کوي، د هغه چا سره مستقیم تماس له لارې چې RSV لري، یا د ککر شوي سطحې لمس کولو سره.
- ډیری لویان چې RSV لري هیڅ ډول نښې نلري. هغه کسان چې دا لري معمولاً به د زکام په څېر متوسط ناروغي لري.
- د RSV سره ډیر کوچني ماشومان تقریباً تل نښې نښانې ښيي. پدې کې خرابت، د فعالیت کموالی، لږ څښاک یا خواره خوړل، او د خوب کموالی (د لسو ثانیو څخه زیات د تنفس ځنډول) شامل دي.
- RSV کولی شي په ماشومانو او کوچنیو ماشومانو کې د سختو ناروغيو لامل شي لکه برونکایټس (په سرو کې د کوچنیو هوایی لارو التهاب) یا نمونیا (د سرو انتان).



## د RSV انټي باډي (نیرسیویماب)

- د RSV انټي باډي د یو ځل لپاره ورکول کېږي.
- دا د 8 میاشتو څخه کم عمر لرونکو ماشومانو لپاره سپارښتنه کېږي چې دمخه د مور د RSV واکسین له لارې خوندي شوي ندي. دا د اکتوبر څخه تر مارچ میاشتو پورې ماشومانو ته ورکول کېږي.
- جانبې عوارض معمولاً نرم وي او ژر پای ته رسېږي.

